

La victime s'étouffe

Un corps étranger empêche la victime de respirer. Elle ne peut plus parler, crier, tousser, elle s'agite, devient bleue et peut perdre connaissance.

1 à 5 claques vigoureuses dans le dos.

Si inefficace: 1 à 5 compressions abdominales chez l'adulte ou thoraciques chez l'adulte obèse ou la femme enceinte.



Pour la victime qui peut tenir sur la cuisse du sauveteur.



Pour la victime qui peut tenir sur l'avant-bras du sauveteur.



1 à 5
claques
dans le dos



1 à 5
compressions
abdominales



1 à 5
claques
dans le dos



1 à 5
compressions
thoraciques

Alerter et surveiller.

La victime se plaint de malaise

La victime répond qu'elle ne se sent pas bien.

Observer les signes de l'accident cardiaque, de l'accident vasculaire cérébral qui nécessitent une prise en charge urgente.

Et les autres signes :

douleur abdominale intense, difficulté à parler ou à respirer, sensation de froid, sueurs, pâleur.



Position
allongée



Position assise
si difficulté
respiratoire

Mettre la victime au repos.

Se renseigner sur son état de santé.

Appeler le 15. Surveiller.

La victime présente un traumatisme

En cas de choc, coup, chute, faux mouvement.
Empêcher de bouger la zone atteinte.

Alerter et surveiller.

La victime présente une plaie

Plaie simple: se laver les mains, nettoyer la plaie à l'eau courante avec ou sans savon, éventuellement désinfecter, protéger par un pansement, vérifier la vaccination antitétanique et surveiller.

Plaie grave: installer la victime en position d'attente, ne pas retirer le corps étranger.



Plaie au thorax:
position assise.



Plaie abdominale:
position allongée,
jambes fléchies.



Plaie à l'œil:
position allongée,
yeux fermés, sans
bouger la tête.


Dans tous les autres cas, position allongée.

Alerter les secours. Surveiller la victime.

La victime présente une brûlure

Refroidir immédiatement la surface brûlée par ruissellement d'eau tempérée, au plus tard, dans les 30 minutes suivant la brûlure.

Si la brûlure est grave, **alerter les secours** et appliquer les consignes.



MAIF.FR

Retrouvez-nous aussi sur   

MAIF - Société d'assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9.
FILIA-MAIF - Société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré RCS Niort
341 672 681 - CS 20000 - 79076 Niort cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances.
7117GPS-A - 01/2020 - Réalisation : Studio Arengo - © Laurent RUILIER/comillius.com



ENSEMBLE POUR FORMER AUX PREMIERS SECOURS



NUMÉROS D'URGENCE:

Un message clair:

- le numéro de téléphone,
- la nature du problème et la localisation très précise de l'événement,
- répondre aux questions,
- appliquer les consignes et raccrocher sur les instructions de l'opérateur.



15
SAMU

18
POMPIERS

112
NUMÉRO
D'URGENCE
EUROPÉEN

114
NUMÉRO D'URGENCE
POUR SOURDS ET
MALENTENDANTS

Prévention et secours civiques (PSC1)
Tous acteurs de la sécurité civile



La victime présente une hémorragie

LA CONDUITE À TENIR


La perte de sang prolongée ne s'arrête pas spontanément :

- arrêter l'hémorragie ;
- allonger la victime ;
- faire alerter ou alerter les secours ;
- parler régulièrement à la victime en attendant les secours ;
- protéger la victime contre la chaleur, le froid ou les intempéries ;
- surveiller la victime.

LES TECHNIQUES



Comprimer l'endroit qui saigne, main protégée, si possible




ou à l'aide d'un pansement compressif


SI INEFFICACE OU IMPOSSIBLE

réaliser un garrot improvisé « tourniquet ».

Mettre en place le lien au-dessus de la plaie qui saigne.



Serrer le garrot en tournant la barre jusqu'à l'arrêt du saignement.



En l'absence de barre, serrer le nœud le plus fortement possible et réaliser un double nœud de maintien.

La victime a perdu connaissance

Libérer les voies aériennes

Basculer la tête en arrière et relever le menton.



LA VICTIME RESPIRE

Mettre la victime en position latérale de sécurité (PLS)




Alerter et surveiller la victime jusqu'à l'arrivée des secours.

La victime est en arrêt cardiaque

LA VICTIME NE RÉPOND À AUCUNE SOLlicitATION

Apprécier la respiration

Regarder, écouter, sentir pendant 10 secondes maximum.



LA VICTIME NE RESPIRE PAS OU PRÉSENTE UNE RESPIRATION ANORMALE

Alerter ou faire alerter les secours et demander un défibrillateur



Adulte



Enfant



Bébé

30 compressions thoraciques, 100 à 120/min,





Position neutre pour le bébé



suivies de 2 insufflations. Répéter ces cycles.

Chez l'adulte, l'enfant et le bébé, mettre en œuvre le défibrillateur dès son arrivée et suivre les consignes.



Réactivez vos connaissances :
www.youtube.com/maif/playlists

Alerte et protection des populations



Renseignez vous
<http://www.interieur.gouv.fr/Alerte/Alerte-ORSEC>
www.gouvernement.fr/risques